



MICHAEL J. BROWN, M.D., P.L.L.C.
Cirujano Cosmetico

**CONSENTIMIENTO INFORMADO A LA OPERACION -
CIRUGIA DE BLEFAROPLASTIA
(CIRUGIA PLASTICA DE LOS PARPADOS)**

INSTRUCCIONES

Este es un consentimiento informado a la operación que ha sido preparado para ayudarle a que el cirujano le informe sobre la blefaroplastia, sus riesgos y tratamientos alternos.

Es importante que usted lea esta información cuidadosa y completamente. Por favor ponga sus iniciales en cada página, indicando que usted las ha leído y firme el consentimiento para la cirugía propuesta por su cirujano plástico.

INTRODUCCION

La blefaroplastia es una operación quirúrgica que se utiliza para extraer el exceso de piel y músculo tanto en los párpados superiores como los inferiores al mismo tiempo que se extrae tejido graso. La blefaroplastía puede mejorar la piel caída y la formación de bolsas u ojeras en los párpados. Puede ayudar a mejorar la visión en pacientes de edad avanzada quienes tengan una caída excesiva de los párpados superiores. Aunque puede agregar un pliegue en el párpado superior en personas de origen asiático, no borrará la evidencia de los rasgos raciales o étnicos. La blefaroplastia no retira las llamadas "patas de gallo" ni otras arrugas. Tampoco elimina las ojeras ni levanta las cejas caídas.

La cirugía de blefaroplastia se ajusta según el paciente, dependiendo de sus necesidades particulares. Se puede realizar sola implicando las regiones del párpado superior, el inferior o ambas, o también en conjunto con otras operaciones quirúrgicas del ojo, cara, ceja o nariz. La cirugía del párpado no puede detener el proceso de envejecimiento. Sin embargo, sí puede disminuir la apariencia de la piel flácida o formación de bolsas en la región del párpado.

TRATAMIENTOS ALTERNOS

Las formas alternas de manejo incluyen el no tratar la flacidez ni formación de bolsas de la piel en los párpados por medio de la cirugía. El mejoramiento de flacidez en la piel, depósitos de tejido graso y arrugas de la piel se puede lograr por medio de otros tratamientos u otras formas de cirugía tales como una ritidectomía coronal cuando sea lo indicado. Podrán ser necesarias otras formas de cirugía del párpado en caso de que hayan trastornos que afecten la función del párpado tales como párpados caídos debido a problemas musculares o flacidez entre el párpado y la esfera del ojo (ectoprión). Las pequeñas arrugas de la piel se pueden mejorar por medio de exfoliadores químicos para la piel, láser u otros tratamientos de la piel. Hay riesgos y complicaciones potenciales asociados a las formas alternas del tratamiento.

RIESGOS de la CIRUGIA DE BLEFAROPLASTIA (CIRUGIA PLASTICA DE LOS PARPADOS)

Cada operación quirúrgica implica cierto riesgo y es importante que usted entienda los riesgos que implica la cirugía de blefaroplastia. La decisión que un individuo toma de someterse a una operación quirúrgica se basa en comparar el riesgo con el beneficio potencial. Aunque la mayoría de los pacientes no experimentan las siguientes complicaciones, usted debe hablar de cada una de ellas con su cirujano plástico y cerciorarse de que entienda los riesgos, complicaciones potenciales y consecuencias de la cirugía de blefaroplastia.

Hemorragia- Es posible, aunque poco usual, que se presente un episodio de hemorragia durante o después de la cirugía. La hemorragia puede ocurrir debajo de la piel o internamente alrededor de la esfera del ojo. Si se presenta hemorragia postoperatoria, se requerirá de un tratamiento de urgencia o cirugía. No tome ninguna aspirina o medicamento antiinflamatorio durante diez días antes de la cirugía, ya que esto puede contribuir a aumentar el riesgo de problema de hemorragia. La hipertensión (presión alta) que no esté bajo buen control médico puede causar hemorragia durante o después de la cirugía. Las acumulaciones de sangre dentro de los párpados pueden retardar la recuperación y ocasionar la formación de cicatrices.

Riesgos de la Cirugía de Blefaroplastia, continuación

Ceguera- Es extremadamente raro que se dé la ceguera después de una cirugía de blefaroplastia. Sin embargo, ésta se puede ocasionar por una hemorragia interna alrededor del ojo durante o después de una cirugía. No es predecible la ocurrencia de ésta.

Infección- Es muy raro que se dé una infección después de una cirugía. En caso de que haya una infección, podrá ser necesario tratamiento adicional incluyendo el uso de antibióticos.

Cicatrización- Aunque se espera una buena cicatrización después de una cirugía, pueden darse cicatrices anormales entre el párpado y los tejidos subcutáneos. En casos raros pueden resultar cicatrices anormales. Las cicatrices pueden ser poco atractivas y de diferente color que la piel que les rodea. Existe la posibilidad de marcas visibles en el párpado o pequeñas tumoraciones de la piel debido a las suturas. Podrán ser necesarios tratamientos adicionales para tratar la cicatrización.

Daño a las estructuras más profundas- Es probable dañar las estructuras subcutáneas tales como los nervios, vasos sanguíneos y músculos del ojo durante el curso de la cirugía. El potencial de que esto ocurra varía según el tipo de operación de blefaroplastia que se esté realizando. El daño a las estructuras subcutáneas puede ser temporal o permanente.

Problemas de falta de humedad en los ojos- Hay trastornos permanentes que pueden disminuir la producción de lágrimas después de una blefaroplastia. La ocurrencia es rara y no completamente predecible. A los individuos quienes normalmente tienen ojos secos se les puede sugerir que tengan precaución especial al considerar la cirugía de blefaroplastia.

Asimetría- La región de la cara y el cuerpo humano es normalmente asimétrica. Puede haber una variación de un lado al otro una vez que se realice cirugía de blefaroplastia.

Dolor crónico- Puede ocurrir dolor crónico muy infrecuentemente después de una blefaroplastia.

Trastornos de la piel y cáncer en piel- Una blefaroplastia es una operación quirúrgica que se utiliza para estirar la piel suelta y estructuras subcutáneas del párpado. Los trastornos de la piel y el cáncer en la misma pueden ocurrir independientemente de realizar una cirugía del párpado.

Ectoprión- El desplazamiento del párpado inferior en dirección opuesta del globo ocular es una complicación rara. Se podrá requerir más cirugía para corregir esta condición.

Problemas de exposición corneal- Ciertos pacientes experimentan dificultades al cerrar sus párpados después de la cirugía y pueden ocurrir problemas en la córnea debido a que éstos se secan. En caso de que ocurra esa rara complicación, podrán ser necesarios tratamientos adicionales o cirugía con tratamiento.

Resultado no satisfactorio- Existe la posibilidad de un mal resultado en la cirugía del párpado. La cirugía puede resultar en deformaciones visibles inaceptables, pérdida de función, alteración de la herida y pérdida de sensibilidad. Es probable que quede decepcionado con los resultados de la cirugía. Infrecuentemente, es necesario realizar cirugía adicional para mejorar sus resultados. Las operaciones quirúrgicas adicionales tales como una ritidectomía coronal podrán ser necesarios para corregir la caída de la ceja, la cual contribuye a problemas del párpado superior.

Reacciones alérgicas- En raros casos, se han reportado alergias locales a la cinta, material de suturas o preparaciones tópicas. Las reacciones sistémicas, que son más serias, pueden resultar debido a los fármacos utilizados durante la cirugía y las medicinas recetadas. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional.

Pérdida de pestañas- Puede ocurrir pérdida de las pestañas en el área del párpado inferior de donde se eleva la piel durante la cirugía. No es predecible que esto ocurra. La pérdida de vello puede ser temporal o permanente.

Recuperación lenta- Es posible que haya una alteración a la herida o una recuperación lenta de la misma.

Riesgos de la Cirugía de Blefaroplastia, continuación

Efectos a largo plazo- Pueden ocurrir alteraciones subsecuentes en la apariencia del párpado como resultado del envejecimiento, de perder o ganar peso, exposición al sol u otras circunstancias no relacionadas con la cirugía del párpado. La cirugía de blefaroplastia no detiene el proceso de envejecimiento ni produce un estiramiento permanente de la región del párpado. Podrán ser necesarios cirugía futura u otros tratamientos para mantener los resultados de una blefaroplastia.

Anestesia quirúrgica- Tanto la anestesia local como general implican un riesgo. Existe la posibilidad de complicaciones, lesiones e incluso la muerte debido a las formas de anestesia o sedación quirúrgicas.

SEGURO MEDICO

Si la separación del párpado superior interfiere con su visión, es posible que su compañía de seguros cubra la cirugía de blefaroplastia para los párpados superiores solamente. La mayoría de las compañías de seguros excluyen cobertura para cirugía cosmética tales como blefaroplastia del párpado inferior o cualquier otra complicación que pueda ocurrir debido a una cirugía. Por favor revise cuidadosamente el folleto de información de su compañía de seguros.

CIRUGIA NECESARIA ADICIONAL

Hay muchas condiciones variables además del riesgo y complicaciones potenciales de la cirugía que pueden influir en un resultado a largo plazo de la cirugía del párpado. Aunque los riesgos y complicaciones ocurren con poca frecuencia, los riesgos citados son particularmente asociados con la cirugía de blefaroplastia. Pueden haber otras complicaciones y riesgos pero son todavía menos comunes. Si hay complicaciones, podrán ser necesarios otros tratamientos o cirugía adicional. La práctica de la medicina y cirugía no es una ciencia exacta. Aunque se esperan buenos resultados, no hay garantía expresa ni implícita sobre los resultados que se puedan obtener.

RESPONSABILIDAD FINANCIERA

El costo de la cirugía implica varios cargos por los servicios que se ofrecen. El total incluye los honorarios de su médico, el costo de los suministros quirúrgicos, anestesia, pruebas de laboratorio y posibles cargos de pacientes ambulatorios hospitalarios, dependiendo de dónde se lleve a cabo la cirugía. Dependiendo de que el costo de la cirugía sea cubierto por un plan de seguros, usted será responsable por los pagos necesarios, deducibles y cargos que no cubra la compañía de seguros. Puede haber costos adicionales en caso de complicaciones debido a la cirugía. Los cargos por cirugía secundaria u hospitalarios relacionados a la cirugía correctiva también serán su responsabilidad.

RESPONSABILIDAD LEGAL

Los documentos de consentimiento a la operación se utilizan para informar sobre el tratamiento quirúrgico propuesto para una enfermedad o condición adjuntos a la declaración de riesgos y formas alternas de tratamiento o tratamientos. El proceso de consentimiento informado a la operación tiene la intención de definir los principios de la declaración de riesgos que generalmente debe cumplir con las necesidades de la mayor parte de los pacientes en la mayoría de las circunstancias.

Sin embargo, los documentos de consentimiento a la operación no deben considerarse como absolutos para definir otros métodos de cuidado ni los riesgos que se encuentren. Su cirujano plástico le puede dar información adicional o diferente basada en todos los hechos de su caso en particular así como en el estado de sus conocimientos médicos.

Los documentos del consentimiento informado a la operación no tienen la intención de definir ni de servir como un estándar de cuidado médico. Los estándares de cuidado médico se determinan según todos los factores implicados en cada caso individual y están sujetos a cambios conforme avancen los conocimientos científicos y la tecnología y según evolucionen los patrones de la práctica médica.

Es importante que usted lea la información antes mencionada cuidadosamente y que se contesten todas sus preguntas antes de firmar el consentimiento que está en la siguiente página.

CONSENTIMIENTO A CIRUGIA, OPERACION o TRATAMIENTO

1. Por medio de la presente, autorizo al Dr. Michael J. Brown, y los asistentes que seleccione, a desempeñar el siguiente procedimiento o tratamiento:

He recibido la siguiente hoja de información:

CONSENTIMIENTO INFORMADO A LA OPERACION - CIRUGIA DE BLEFAROPLASTIA (CIRUGIA PLASTICA DE LOS PARPADOS)

2. Estoy consciente que durante el curso de la operación y tratamiento médico o anestesia, pueden surgir imprevistos que requieran operaciones diferentes a las antes mencionadas, por lo tanto, autorizo al médico y sus asistentes o personal designado arriba mencionados a que desempeñen las operaciones que según su juicio profesional sean necesarias y deseables. La autoridad otorgada bajo este párrafo incluirá todas las condiciones que requieran tratamiento y que el médico desconoce en el momento de empezar la operación.
3. Autorizo la administración de la anestesia que se considere necesaria y aconsejable. Entiendo que todas las formas de anestesia implican un riesgo y la posibilidad de complicaciones, lesiones y algunas veces la muerte.
4. Reconozco que no se me ha dado garantía alguna por parte de cualquier persona con respecto a los resultados que se puedan obtener.
5. Doy consentimiento a fotografiar o televisar la operación u operaciones o procedimiento o procedimientos a desempeñar, incluyendo las porciones apropiadas de mi cuerpo, para propósitos médicos, científicos o educativos.
6. Para propósitos del mejoramiento de la educación médica, autorizo la entrada de observadores a la sala de operaciones.
7. Doy consentimiento al desecho de tejidos, dispositivos médicos o partes del cuerpo que sean extraídas.
8. Autorizo la liberación de información con respecto a mi número de seguro social a las agencias apropiadas para propósitos legales y licencias de dispositivos médicos, cuando aplique.
9. SE ME HA EXPLICADO DE MANERA QUE YO ENTIENDA LO SIGUIENTE:
 - a. EL TRATAMIENTO U OPERACION ARRIBA MENCIONADA A LA CUAL ME SOMETERE.
 - b. QUE PUEDE HABER OPERACIONES METODOS ALTERNOS AL TRATAMIENTO.
 - c. QUE HAY RIESGOS A LA OPERACION O TRATAMIENTO PROPUESTOS.

DOY CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO U OPERACION Y A LOS PUNTOS ARRIBA MENCIONADOS (1 a 9).

Paciente o Persona Autorizada a Firmar por el Paciente

Fecha _____ Testigo _____